

120.00 mm

175.00 mm

ساخت در شرکت داروسازی سها | کرج - ایران
www.sohapharma.ir



متفوربت®
متفورمین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم

متفوربت به شکل قرص در دوزهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرمی موجود می باشد که در بلیستر های ۱۰ عددی عرضه می گردد.

دسته دارویی:
آنتی دیابتیک (کاهنده قندخون)

موارد مصرف دارو:
در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ جهت کاهش قند خون

راهنمایی های عمومی:
- قبل از مصرف دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:
وجود هرگونه حساسیت، مصرف سایر داروها، ابتلا به بیماری های دیگر، بارداری یا شیردهی

موارد منع مصرف:

- اسیدوز متابولیک حاد و مزمن شامل کتواسیدوز دیابتی و لاکتیک اسیدوز
- حساسیت به متفورمین
- اختلال عملکرد کلیوی شدید
- مصرف زیاد نوشیدنی الکلی
- اختلال عملکرد کبدی شدید
- سوختگی های شدید
- عفونت شدید
- از دست دادن آب شدید
- جراحی و ضربات شدید
- شرایطی که میزان کاهش اکسیژن خون وجود دارد
- در بیماران تحت بررسی های رادیولوژی با تزریق مواد حاجب ید دار

مصرف در بارداری و شیردهی:
این دارو را در بارداری و شیردهی با احتیاط و زیر نظر پزشک می توان مصرف کرد.

هشدارها و احتیاطات مصرف:

- مصرف طولانی مدت این دارو موجب کاهش ویتامین B۱۲ و در نتیجه سبب عارضه آنمی مگالوبلاستیک و نوروپاتی (احساس سوزش، گزگز و بی حسی اندام ها) می شود. بنابراین پارامترهای هماتولوژیک (هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص های گلبول قرمز) باید در شروع درمان و به صورت سالیانه پایش شود و در صورت مشکوک بودن به کم خونی مگالوبلاستیک، سطح فولات نیز باید کنترل شود. همچنین غلظت سرمی ویتامین B۱۲ باید هر ۱ تا ۲ سال یکبار، به ویژه در بیمارانی که بیش از ۴ سال تحت درمان با متفورمین بوده یا مبتلا به نوروپاتی محیطی، کم خونی، سندرم سوچدب و کمبود مصرف مواد غذایی هستند بررسی گردد.
- پیش از عمل جراحی یا آزمایشات پزشکی، با پزشک خود در خصوص مصرف این دارو مشورت نمایید.
- رعایت رژیم غذایی توصیه شده توسط پزشک، ورزش و کنترل گلوکز خون به صورت روزانه در اثر بخشی دارو موثر می باشد.
- آشنایی بیمار با راه های مقابله با افت قند خون و علائم آن نظیر اضطراب، گیجی، لرزش، عرق سرد، ضربان قلب سریع، خستگی غیر عادی و ضعف ضروری است.
- آشنایی بیمار با علائم افزایش قند خون و کتواسیدوزیس شامل آسیب بینایی، خواب آلودگی، خشکی دهان، پوست خشک و برفروخته، تنفس با بوی میوه، تکرر ادرار، وجود کتون در ادرار، کاهش اشتها، معده درد، تهوع، استفراغ، خستگی، مشکل در تنفس، عدم هوشیاری و تشنگی غیرعادی ضروری است.
- در صورت بروز استفراغ مصرف دارو باید قطع گردد.
- در سالمندان دارای اختلال عملکردی کلیوی وابسته به سن یا بیماری عروق محیطی، دوز دارو یا فاصله بین دوزها باید بسته به شرایط بیمار تنظیم گردد و یا در صورت لزوم دارو درمانی قطع شود.
- مقدار قند خون را به صورت دوره ای مطابق با دستور پزشک خود کنترل کنید و در صورت افزایش یا کاهش مقدار قند خون در هنگام مصرف این دارو با پزشک مشورت نمایید.
- کنترل میزان قند خون در شرایط استرس مانند تب، عفونت، جراحی یا جراحی ممکن است دشوارتر باشد. در چنین شرایطی با پزشک خود مشورت نموده و بدون تجویز پزشک از تغییر مقدار مصرف دارو خودداری نمایید.
- در هنگام مصرف دارو آزمایشات مربوط به قند خون ناشتا، هموگلوبین و عملکرد کلیوی را انجام دهید. این آزمایشات به منظور پایش بیماری و یا کنترل عوارض جانبی صورت می گیرد.

Std.Metforbet500&1000-Br-003 Page 1-2

کد آرت ورک: Std.Metforbet500&1000-Br-003		ابعاد: 120 x 175 mm	مقیاس: 1:1	چهار رنگ اصلی:
تهیه کننده:	بازاریابی و فروش:	تحقیقات:	مسئول فنی:	C M Y K100
تولید:	آزمایشگاه:	فنی مهندسی:	بارکد:	

120.00 mm

175.00 mm

ساخت در شرکت داروسازی سها | کرج - ایران
www.sohapharma.ir



متفوربت®
متفورمین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم

- در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب دارو باید با احتیاط مصرف شود.
- این دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید و از مصرف مقادیر بیشتر و یا کمتر و یا به مدت طولانی تر از دستور پزشک خودداری کنید.
- به منظور کاهش احتمال تحریکات معده، این دارو را همراه با غذا مصرف نمایید.
- دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- از مصرف دارو های تاریخ گذشته خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

- در صورت مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:
- الکل
 - آندروژن ها، پگوسومات، لووکتوکونازول
 - داروهای کاهنده ی قند خون
 - داروهای افزایش دهنده ی قند خون
 - دارو های ضد افسردگی مانند: مهارکننده های مونو آمین اکسیداز (سازیلین، موکلوماید و...)، مهارکننده های بازجذب سروتونین (فلوکستین، دولوکستین، سرتالین و...)
 - الفا لیپوتیک اسید
 - گوانتیدین
 - داروهای کاهنده فشار خون مانند: مدرهای تیازیدی، بتابلاکرها، کاپتوپریل، اتالپرل، وراپامیل
 - رانولازین، سایمتیدین، انداسترون، سفالکسین، کینولون ها، تری متوپریم، استازولامید، لاموتریژین، توپیرامات، وارفارین، آسپیرین
 - در صورت مصرف همزمان سایر داروها با این دارو با پزشک خود مشورت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

مقدار مصرف دارو صرفاً توسط پزشک می بایست مشخص گردد اما مقدار مصرف معمول این دارو به شرح ذیل می باشد:

در دیابت تیپ ۲ به صورت تک درمانی یا به صورت ترکیب با سایر داروهای کاهنده قند خون:

شروع مصرف دارو در بزرگسالان یک بار در روز همراه غذا می باشد که مقدار مصرف، بر اساس رژیم غذایی، تحمل بیمار و کارایی این دارو، طبق نظر پزشک تنظیم می گردد.

حداکثر میزان مصرف این دارو ۲۰۰۰ میلی گرم در روز می باشد.

به نکات زیر در خصوص نحوه مصرف این دارو توجه کنید:

- این دارو را هر روز در یک زمان مشخص مطابق با دستور پزشک مصرف نمایید. مدت زمان مصرف و یا قطع مصرف دارو باید توسط پزشک معالج تعیین گردد.

- چنانچه یک نوبت از مصرف دارو را فراموش نمودید، به محض یساده آوری دارو را مصرف نمایید، اما در صورت نزدیک بودن به زمان مصرف دوز بعدی، از مصرف نوبت فراموش شده خودداری نموده و مقدار مصرف بعدی را دو برابر نکنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی شود لیکن در صورت بروز هر یک از عوارض، بلافاصله پزشک خود را مطلع سازید:

- درد شکمی، کاهش اشتها، اسهال، تهوع، استفراغ، اختلالات معدی-روده ای، نفخ و سوزش
- کم خونی مگالوبلاستیک و نوروپاتی (به علت کاهش جذب ویتامین B۱۲)، لاکتیک اسیدوزیس، واکنش های پوستی و التهاب کبد
- همچنین این دارو می تواند باعث یک عارضه نادر اما جدی بنام اسیدوز لاکتیک شود که حتی در مواردی ممکن است منجر به مرگ گردد. در صورت بروز عوارض زیر، مصرف دارو را قطع نموده و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید:
- دردهای استخوانی - عضلانی غیر معمول، مشکلات تنفسی، مشکلات ناگهانی معده و درد های شکمی همراه با حالت تهوع یا استفراغ یا اسهال، احساس خستگی و ضعف غیر طبیعی، گر گرفتگی، احساس سردرد یا سرگیجه، ضربان قلب نامنظم یا آهسته

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود.

Ref: USPDI2007

Lexi-Comp's drug interactions Handbook

BNF 79

UpToDate

Std.Metforbet500&1000-Br-003

Page 2-2

کد آرت ورک: Std.Metforbet500&1000-Br-003		ابعاد: 120 x 175 mm		مقیاس: 1:1		چهار رنگ اصلی:	
تهیه کننده:		بازاریابی و فروش:		تحقیقات:		مسئول فنی:	
تولید:		آزمایشگاه:		فنی مهندسی:		بارکد:	